



**ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ
ШТАММА COVID-19 ОМИКРОН**



ПРИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ (АНТИБИОТИКИ)

ПРИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НЕ ПОКАЗАН ПРИ ОРВИ, ТАК КАК РЕЧЬ ИДЕТ О ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА



ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕЗОННЫХ ОРВИ — ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА, ГРИППФЕРОН, УМИФЕНОВИР (АРБИДОЛ), РИАМИЛОВИР (ТРИАЗАВЕРИН)

СТАНДАРТНЫЙ КУРС ТЕРАПИИ ПРОТИВОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ПРОВОДИМЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТ 5 СУТОК




ПРИ БОЛИ ПРИ ГЛОТАНИИ, ПЕРШЕНИЕ, ПОКРАСНЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ
АНТИСЕПТИКИ (НАПРИМЕР,
МИРАМИСТИН), ПАСТИЛКИ ИЛИ
ЛЕДЕНЦЫ, СПРЕИ, ПОЛОСКАНИЯ,
А ТАКЖЕ **ПОЛОСКАНИЕ ГОРЛА**
РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА
НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ



ПРИ НАСМОРКЕ И ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА

**ПРИНИМАТЬ 2-3 РАЗА В ДЕНЬ
НАЗАЛЬНЫЕ КАПЛИ
С СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ, ПРОМЫВАТЬ НОС
РАСТВОРАМИ НА ОСНОВЕ
НАТУРАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СОЛИ
– ЧЕМ ЧАЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!**



ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

$\leq 38^{\circ}\text{C}$

СНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ НЕ НАДО



$\geq 38,5^{\circ}\text{C}$

ПРИНЯТЬ
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
СРЕДСТВА
(ПАРАЦЕТАМОЛ ИЛИ
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ
КИСЛОТУ), ЕСЛИ БОЛЕЕ
3-Х ДНЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К
ВРАЧУ

